

BASIC

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Η σειρά πάχυνσης στη θάλασσα είναι αυτή που εκτιμάται περισσότερο από την αγορά λόγω του χαμηλού ποσοστού ενέργειας που χρησιμοποιείται κυρίως στις καλλιέργειες της τσιπούρας στην ανοικτή θάλασσα (off-shore). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και στο λαβράκι στην περίοδο της άνοιξης/φθινοπώρου. Πλήρως βυθιζόμενα, περιέχουν **LAPs (Land Animal Products)**.

ΧΗΜΙΚΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (άνευ επεξεργασίας)

	BASIC 3	BASIC 4	BASIC 6	BASIC 8
Κοκκομετρία	3.6-4.6	4,6 - 5,6	6,4 - 7,4	8,6 - 9,6
Ακατέργαστη πρωτεΐνη %	42,00	42,00	42,00	42,00
Ακατέργαστα έλαια και λίπη %	18,00	18,00	18,00	18,00
Ακατέργαστες ίνες %	4,00	4,00	4,00	3,50
Ακατέργαστη τέφρα %	9,00	9,00	9,00	9,20
Σύνολο υδατανθράκων %	18,00	18,00	18,00	18,30
Φώσφορο %	1,45	1,45	1,45	1,45
Βιταμίνη C mg/kg	160	160	160	160
Βιταμίνη E mg/kg	160	160	160	160
Εύπεπτη ενέργεια mj/kg	16,80	16,80	16,80	16,76

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σε % επί του ζώντος βάρους, υπολογισμένη σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του νερού

Βάρος ψαριών (gr)	Τύπος τροφής	12° C	15° C	18° C	21° C	24° C	26° C	28° C	30° C	αρ. γευμάτων ν/ημέρα
50 - 90	BASIC 3	0.5	1.1	1.4	1.7	2.0	2.2	1.4	0.9	2
80 - 220	BASIC 4	0,5	0,9	1,2	1,5	1,7	1,8	1,3	0,7	1-2
200 - 1.700	BASIC 6	0,4	0,7	1	1,3	1,4	1,5	1,2	0,5	1
> 1.500	BASIC 8	0,3	0,5	0,8	1,1	1,2	1,3	1	0,4	1

ΣΗΜ.: όλες οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας των ψαριών και την πυκνότητα εκτροφής. Πριν από τη διαφοροποίηση του προγράμματος σίτισης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην αναπαραγωγή και στην τελική ποιότητα του προϊόντος, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το δικό μας Τμήμα Κτηνιατρικής.

www.fishfeed.eu

